

(限定)Kd(Carfilzomib DEX) twice-weekly【1cycle】 Ver.1.3

	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28	
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 20mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 20mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 56mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 56mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 56mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 3瓶 10時 投与 (15)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与 1回</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カiproリス(10, 40) … 56mg/m² 10時45分 投与 (30)分で投与 ○注用水で溶解 1回</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時15分 投与 フラッシュ用 1回</p>			
投薬									

出典: Lancet Oncol 2016;17:27-38

★day22にレナテックス(DEX)20mg/日を2日分の処方入力必要!