

(限定)KRd(Carfilzomib/LEN/DEX)【1cycle】

	Day1	Day2	Day8	Day9	Day15	Day16	Day22	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 6瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 20mg/m<sup>2</sup>(15-44) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 20mg/m<sup>2</sup>(15-44) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 20mg/m<sup>2</sup>(15-44) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 6瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 6瓶 10時 投与 (15)分で投与</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 10時15分 投与 (30)分で投与</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 0.5瓶 ■カイプロリス … 27mg/m<sup>2</sup>(15-59.4) 10時45分 投与 (10)分で投与 ○注用水で溶解し、★5%Glu50mLに加える。</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 11時 投与 フラッシュ用</p>		
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! (限定)レプラミドカプセル5mg … 5Cap 1日1回 寝る前 ○KRd: 3週投与1週休薬。day1の夜から開始 21日</p>							

出典: NEJM 2015; 372:142-52

★day22にレナテックス(DEX)40mgの処方入力必要!