

大腸癌 アービタックス+mFOLFOX6(2クール目以降)Ver.2.2

	Day1	Day8	Day14
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1 ハ`ロ/セトロン点滴静注ハ`グ0.75mg/50mL … 1袋 ! デキサート注6.6mg(デ`カト`ロン8mg)瓶 … 1瓶 ! デキサート注1.65mg(デ`カト`ロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (?)時間で投与 … 1時間 【全量240mLに調製】4mL/分 10時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 アービタックス終了後1時間経過観察 11時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 12時 投与 側管注 … 1 ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 12時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 400mg/m² ホーラス投与 14時 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 14時 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 2400mg/m² (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】ニプロシユアーフューザー`ポンプ`を使用 14時 投与 中心静脈注射 … 1	■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! デキサート注6.6mg(デ`カト`ロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 250mg/m² (?)時間で投与 … 1時間 【全量240mLに調製】4mL/分 10時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 アービタックス終了後1時間経過観察 11時 投与 中心静脈注射 … 1	
投薬	■---【投薬】 ! デ`カト`ロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日		

出典:J Clin Oncol 2009; 27: 663-671