

# 大腸癌 ヘパシマブ+mFOLFOX6(4回目以降) Ver.3.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残りプライミングに使用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘパシマブ … 5mg/kg(150-500) 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1</p> <p>パロセトン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサト注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン … 85mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m<sup>2</sup> 13時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後フラッシュ 13時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m<sup>2</sup> 13時 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニプロシユア-フュ-サー-ポンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	

出典: Kabbavar FF, et al.: J Clin Oncol; 23:3706(2005)