

大腸癌 mFOLFOX6 Ver.2.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テクトロン8mg) … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テクトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン … 85mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m²(300-800) 12時30分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後のフラッシュ 12時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m²(2000-4800) 12時30分 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニプロシアーフューザーポンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テクトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	

出典:大腸癌治療ガイドライン(大腸癌研究会編2005年)、国立がんセンターレジメン