

# 大腸癌 ヘバシズマブ+FOLFIRI(4回目以降)Ver.4.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残フラッシングに使用。 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘバシズマブ(100、400) … 5mg/kg 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (2)時間で投与 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 1.5時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>■5-FU(1000) … 400mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 13時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後フラッシュ 13時 投与 点滴 … 1</p> <p>■5-FU(1000) … 2400mg/m<sup>2</sup> 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 13時 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニプロシューア-フューザー-ポンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	