

大腸癌 FOLFIRI Ver.2.3

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>ハ°ロセトロン点滴静注ハ°ック°0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テ°カト°ロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テ°カト°ロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン … 150mg/m²(80-300) (?)時間で投与 … 1.5時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m²(300-800) 12時30分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホ°ラス後フラッシュ 12時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m²(2000-4800) 12時30分 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニ°フロシアーフューサー°ポンプ°を使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	

出典:大腸癌治療ガイドライン(大腸癌研究会編2005年)