

# 大腸癌 ヘクティビックス+sLV5FU2 Ver.1.3

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残りプライミングに使用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ！テキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 10時15分 投与 (?)分で投与 … 15分 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベクティビックス(100、400) … 6mg/kg (?)時間で投与 … 1時間 【全量100mLに調製】 ○フィルター使用確認 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 ○Pmab投与後1時間経過観察 11時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 12時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 400mg/m<sup>2</sup> 14時45分 投与 点滴 … 1 ホース投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後フラッシュ 14時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 2400mg/m<sup>2</sup> 15時 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニプロシューア-フューサー-ポンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>！テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	