

大腸癌 ベバシズマブ+XELOX療法(4回目以降)Ver.3.2

	Day1	Day21
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (?)分で投与 … 15分 静脈内注射 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 7.5mg/kg 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1 パロ/セロン点滴静注ﾊﾞｯｸ0.75mg/50mL … 1袋 !ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1 ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m²(85-260) !ﾃﾞｷｻｰﾄ注6.6mg(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 11時 投与 精密持続点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ﾌﾗｯｼｭ用 13時 投与 点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 投与量は下記参照(1回量) 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 14日 !ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日	

体表面積(m²)	1回用量(1日2回)		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.36未満	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36以上 ~ 1.41未満	1,500mg(5錠)		
1.41以上 ~ 1.51未満			
1.51以上 ~ 1.66未満			
1.66以上 ~ 1.81未満	1,800mg(6錠)	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)
1.81以上 ~ 1.96未満			
1.96以上 ~ 2.11未満	2,100mg(7錠)	1,500mg(5錠)	900mg(3錠)
2.11以上			
			1,200mg(4錠)

出典: J Clin Oncol. 2008; 26: 2013-9