

大腸癌 XELOX療法Ver.2.3

| | Day1 | Day21 |
|------|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! デキサト注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² ! デキサト注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 フラッシュ用 12時30分 投与 点滴 … 1</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>■カペシタビン(C法) … 投与量は下記参照(1回量) 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 14日 ! デカトロン錠[4mg] … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p> | |

出典:①J Clin Oncol. 2008; 26: 2006-12. ②Ann of Oncol, 2008; 19: 1720-6.

| 体表面積(m ²) | 1回用量(1日2回) | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 初回投与量 | 減量段階① | 減量段階② |
| 1.36未満 | 1,200mg(4錠) | 900mg(3錠) | 600mg(2錠) |
| 1.36以上 ~ 1.41未満 | 1,500mg(5錠) | 1,200mg(4錠) | 900mg(3錠) |
| 1.41以上 ~ 1.51未満 | | | |
| 1.51以上 ~ 1.66未満 | | | |
| 1.66以上 ~ 1.81未満 | 1,800mg(6錠) | 1,500mg(5錠) | 900mg(3錠) |
| 1.81以上 ~ 1.96未満 | | | |
| 1.96以上 ~ 2.11未満 | 2,100mg(7錠) | 1,500mg(5錠) | 900mg(3錠) |
| 2.11以上 | | | |
| | | | 1,200mg(4錠) |