

大腸癌 ベバシズマブ+SOX療法(4回目以降)Ver.3.3

	Day1	Day21
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 7.5mg/kg (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² (75-) (?)時間で投与 … 2時間 11時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 13時 投与 点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 ■ティーエスワン …下記参照 1日2回 朝・夕 食後 14日 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(BV+SOX)	

出典:J Clin Oncol 31, 2013(suppl; abstr 3519)

	オキサリプラチン(L-OHP)	TS-1		
		体表面積 1.25㎡未満	体表面積 1.25㎡ ~1.5㎡未満	体表面積 1.5㎡以上
初回基準量	130mg/㎡	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	100mg/㎡	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	75mg/㎡	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。