

大腸癌 SIRB療法(4回目以降)Ver.3.2

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘパシスマブ(100、400) … 7.5mg/kg (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m² (?)分で投与 … 90分 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 14日分 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(SIRB)</p> <p>! テカドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 2日分 【注射翌日より内服】</p>	

○出典:臨床第Ⅲ相試験(TRICOLORE)実施計画書

	CPT-11	TS-1		
		体表面積 1.25m ² 未満	体表面積 1.25m ² ~1.5m ² 未満	体表面積 1.5m ² 以上
初回基準量	150mg/m ²	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	125mg/m ²	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	100mg/m ²	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。