

大腸癌 ベバシズマブ+mXELIRI療法(4回目以降)Ver.1.1

	Day1	Day21
抗がん剤	■――【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (?)分で投与 … 15分 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 7.5mg/kg 10時15分 投与 (30)分で投与 パロ/セトロン点滴静注パグ0.75mg/50mL … 1袋 ！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (15)分で投与 10時45分 投与 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 200mg/m² (90)分で投与 11時 投与 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 フラッシュ用 12時30分 投与	
投薬	■――【投薬】 ■カペシタビン(E法) … 800mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 ○2週投与1週休業(BV/mXELIRI) 14日 ！テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日	

出典：Lancet Oncol 2018；19：660-71

体表面積（㎡）	1回用量（1日2回）		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.26未満	900mg（3錠）	600mg（2錠）	600mg（2錠）
1.26以上　～　1.31未満		900mg（3錠）	
1.31以上　～　1.69未満	1,200mg（4錠）		
1.69以上　～　1.76未満	1,500mg（5錠）		
1.76以上　～　1.88未満		1,200mg（4錠）	
1.88以上　～　2.07未満			
2.07以上　～　2.26未満	1,800mg（6錠）	1,500mg（5錠）	900mg（3錠）
2.26以上			