

大腸癌 mXELIRI療法 Ver.1.1

| | Day1 | Day21 |
|------|--|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサト注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (15)分で投与 10時15分 投与</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 200mg/m² (90)分で投与 10時30分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 フラッシュ用 12時 投与</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】</p> <p>■カペシタビン(E法) … 800mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 ○2週投与1週休薬(BV/mXELIRI) 14日</p> <p>! テカトロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p> | |

出典：Lancet Oncol 2018；19：660-71

| 体表面積 (m ²) | 1回用量 (1日2回) | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 初回投与量 | 減量段階① | 減量段階② |
| 1.26未満 | 900mg (3錠) | 600mg (2錠) | 600mg (2錠) |
| 1.26以上 ~ 1.31未満 | | 900mg (3錠) | |
| 1.31以上 ~ 1.69未満 | 1,200mg (4錠) | | |
| 1.69以上 ~ 1.76未満 | 1,500mg (5錠) | 1,200mg (4錠) | |
| 1.76以上 ~ 1.88未満 | | | |
| 1.88以上 ~ 2.07未満 | | 1,800mg (6錠) | 1,500mg (5錠) |
| 2.07以上 ~ 2.26未満 | 900mg (3錠) | | |
| 2.26以上 | | | |