

# 膵癌 mFOLFIRINOX Ver.1.3

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>ハロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 ○アプレピタント内服確認(オキサリの1h前投与) 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m<sup>2</sup>(50-) (?)時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 12時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m<sup>2</sup>(100-) (?)時間で投与 … 1.5時間 13時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 イリノテカン後フラッシュ 14時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m<sup>2</sup>(1200-) 14時45分 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製する】ニプロシアーフューサーポンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトン錠【4mg】 … 1錠 1日1回 朝食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日 アプレピタントカプセル80mg … 1Cap 1日1回 朝食後 ★化学療法翌日より2日間内服★ 2日</p>	
処置	<p>■---【処置】</p> <p>化学療法前処置 … 1 アプレピタントカプセル125mg … 1Cap</p>	

出典: Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2018)81:1017-1023