

胆道癌 ゲムシタピン+シスプラチン+S-1 (GCS) Ver.1.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL(コンクライトMg) … 0.5管 (?)分で投与 … 90分 9時30分 投与 側管注 … 1</p> <p>パロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサト注6.6mg(テカト8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカト2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 25mg/m² (?)時間で投与 … 1時間 ○全量250mLで調製 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>リタ-T3号 500mL … 1瓶 (?)分で投与 … 90分 ○シスプラチン終了確認後メイン交換 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m² (?)分で投与 … 30分 11時 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○フラッシュ用 11時30分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 7日 注射当日の【夕食後】より開始 ○1週投与1週休薬(GCS)</p> <p>! テカト錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 2日 ★★★化学療法翌日より内服★★★</p>	

出典 : Ann Oncol 2018;29(Suppl.8):viii205-70, ESMO 2018 Congress.6150

	TS-1		
	体表面積 1.25㎡未満	体表面積 1.25㎡ ~1.5㎡未満	体表面積 1.5㎡以上
初回基準量	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	25mg/回※※ (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。