

乳癌 EC(アプレピタント+アロキシあり) Ver.2.4

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ○プライミング用 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 (2)時間で投与 ○アプレピタント125mg内服確認(処置) 10時 投与 側管注 … 1</p> <p>パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトン2mg) … 2管 (15)分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■エピルビシン … 90mg/m² ○全開で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■エンドキサソ … 600mg/m² ○エピルビシン終了後すぐに開始OK (30)分で投与 11時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時45分 投与 フラッシュ用 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>! テカトン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日 アプレピタントカプセル80mg … 1Cap 1日1回 朝食後 ★化学療法翌日より2日間内服★ 2日</p>	
処置	<p>■---【処置】</p> <p>化学療法前処置 … 1 アプレピタントカプセル125mg … 1Cap</p>	

出典:乳癌診療ガイドライン 日本乳癌学会編 2007版