

乳癌(HER2陽性) wHER(継続 2mg/kg) + wPTX【7日コース】 Ver.3.2

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      ガスター注射液20mg 2mL … 1管                      ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶                      ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 1管                      (? )分で投与 … 15分                      9時45分 投与                      点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠                      9時45分 投与                      化学療法前投与(内服) … 1                      1回                      生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 30分                      ○レスタミン内服確認                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋                      ■パクリタキセル(30、100) … 80mg/m<sup>2</sup>                      (? )分で投与 … 60分                      ○フィルター使用確認                      10時30分 投与                      点滴 … 1</p> <p>■ハーセプチン … 2mg/kg                      ○初回投与が問題なければ30分まで短縮可。                      (90)分で投与                      11時30分 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      13時 投与                      点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 2015; 372: 134-41、British Journal of Cancer(2004) 90, 36-40  
 ★【補助療法】12コース実施。その後、トラスツスマブのみ計1年継続。  
 ★【再発・転移】毎週投与