

再発乳癌(サートライン以降) エリブリン(ハラヴェン) Ver.1.2

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ハラヴェン(1) … 1.4mg/m² ○2~5分で投与。 ☆生食25mL抜いて調製! 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○ハラヴェン終了後すぐフラッシュ開始。 10時30分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 100mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■ハラヴェン(1) … 1.4mg/m² ○2~5分で投与。 ☆生食25mL抜いて調製! 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○ハラヴェン終了後すぐフラッシュ開始。 10時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:ハラヴェン静注1mg 適正使用ガイド