

SCLC(2nd line) 単剤 ノギテカン(NGT)Ver.1.1

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg)瓶 … 2管</p> <p>10時 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ハイカムチン(1.1) … 1.0mg/m²</p> <p>10時15分 投与</p> <p>(30)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg)瓶 … 2管</p> <p>10時 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ハイカムチン(1.1) … 1.0mg/m²</p> <p>10時15分 投与</p> <p>(30)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg)瓶 … 2管</p> <p>10時 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ハイカムチン(1.1) … 1.0mg/m²</p> <p>10時15分 投与</p> <p>(30)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg)瓶 … 2管</p> <p>10時 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ハイカムチン(1.1) … 1.0mg/m²</p> <p>10時15分 投与</p> <p>(30)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg)瓶 … 2管</p> <p>10時 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ハイカムチン(1.1) … 1.0mg/m²</p> <p>10時15分 投与</p> <p>(30)分で投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>10時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p>	

出典: J Clin Oncol 1999; 17(2): 658-67