

## (限定)nsNSCLC ヘムブロスマブ カルボプラチン ヘムテレキセド( Pembro CBDCA PEM) Ver.3.1

|      | Day1   | Day21 |
|------|--|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1<br/>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶<br/>10時 投与<br/>(15)分で投与<br/>○アプレビタント125mg内服確認！</p> <p>点滴 … 1<br/>生理食塩液 100mL … 1瓶<br/>■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg/body<br/>10時15分 投与<br/>(30)分で投与<br/>○フィルター使用確認！</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶<br/>(15)分で投与<br/>10時45分 投与<br/>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶<br/>グラニセトロ静注1mg/シリンジ(カイトリル) … 1筒<br/>! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 3管<br/>(15)分で投与<br/>11時 投与<br/>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶<br/>■ヘムテレキセド(100、500) … 500mg/m<sup>2</sup><br/>(10)分で投与<br/>11時15～11時25分まで<br/>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋<br/>■カルボプラチン … AUC=5<br/>(1)時間で投与<br/>11時30分 投与<br/>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶<br/>(15)分で投与<br/>12時30分 投与<br/>点滴 … 1</p> |       |
| 投薬   | <p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタントカプセル80mg … 1Cap<br/>1日1回 朝食後<br/>★★★化学療法翌日より2日間内服★★★<br/>2日</p>  |       |
| 処置   | <p>■---【処置】</p> <p>化学療法前処置 … 1<br/>アプレビタントカプセル125mg … 1Cap</p>   |       |

出典:N Engl J Med 2018; 378: 2078-92

★初回:7日前にメチオバール2A筋注(9週ごと)、バンピタン1g内服(連日)(中止する場合はday22まで可能な限り投与する)

★4コース実施後は維持療法へ