

(限定)nsNSCLC ペムブロリスマブ ペムトレキセド〔維持療法〕(Pembro PEM) Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (15)分で投与 ○プライミング用</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg/kg 10時15分 投与 (30)分で投与 ○フィルター使用確認!</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時45分 投与 (15)分で投与 ○フラッシュ用</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサト注6.6mg(テカトロ8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ペムトレキセド(100、500) … 500mg/m² (10)分で投与 11時15分～11時25分まで 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 2018; 378: 2078-92

★初回: 7日前にメチコパール2A筋注(9週ごと)、パンプタン1g内服(連日)(中止する場合はday22まで可能な限り投与する)