

尿路上皮癌(ゲムシタビン+カルボプラチン)Ver.3.2

	Day1	Day8	Day15	Day28	
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            グラセロン静注1mgシリンジ … 1筒            ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 3管            (? )分で投与 … 15分            10時15分 投与            ○カルボプラチン投与1時間前にアプレビタント125mg内服を確認            点滴 … 1</p> <p>■カルボプラチン(50、150、450) … 目標AUC=5(70-750)            ヴィタ-T1号 200mL … 1瓶            (? )分で投与 … 60分            10時30分 投与            点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup>            ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            (? )分で投与 … 30分            11時30分 投与            【全量100mLに調製する】            点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            (? )分で投与 … 15分            12時 投与            点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶            (? )分で投与 … 15分            10時15分 投与            点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup>            ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            (? )分で投与 … 30分            10時30分 投与            【全量100mLに調製する】            点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            (? )分で投与 … 15分            11時 投与            点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶            (? )分で投与 … 15分            10時15分 投与            点滴 … 1</p> <p>■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup>            ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶            (? )分で投与 … 30分            10時30分 投与            【全量100mLに調製する】            点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶            (? )分で投与 … 15分            11時 投与            点滴 … 1</p>		
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>アプレビタントカプセル80mg … 1Cap            1日1回 朝食後            ★★★化学療法翌日より2日間内服★★★            2日</p>				
処置	<p>■---【処置】</p> <p>化学療法前処置 … 1            アプレビタントカプセル125mg … 1Cap</p>				