

尿路上皮癌 ゲムシタビン+シスプラチン[NAC]3週投与 Ver.1.1

	Day1	Day2	Day3	Day8	Day21
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 硫酸Mg補正液20mEq/20mL … 0.5管 (2)時間で投与 9時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 (2)時間で投与 11時 投与 点滴 … 1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テクトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テクトロン2mg) … 2管 (15)分で投与 10時 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時15分 投与 【全量100mLに調製する】 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 10時45分 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 D-マンニトール注射液 20%300mL … 1瓶 (1)時間で投与 11時 投与 ○アプレビタント内服確認! 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■シスプラチン(10、50) … 70mg/m² (3)時間で投与 12時 投与 全量500mLに調製 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 (2)時間で投与 15時 投与 【抗がん剤ルート】 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 500mL … 1袋 (5)時間で投与 17時 投与 点滴 … 1 YDソリター-T1号輸液 500mL … 1袋 (5)時間で投与 22時 投与 点滴 … 1	■---【注射】 YDソリター-T1号輸液 500mL … 1袋 (12)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1 ラクテックD注 500mL … 1袋 (12)時間で投与 15時 投与 点滴 … 1	■---【注射】 YDソリター-T1号輸液 500mL … 1袋 (6)時間で投与 3時 投与 点滴 … 1 ラクテックD注 500mL … 1袋 (6)時間で投与 15時で抜針 9時 投与 点滴 … 1	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テクトロン8mg)瓶 … 1瓶 (15)分で投与 10時15分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (30)分で投与 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 11時 投与 点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 アプレビタントカプセル125mg … 1Cap 1日1回 化学療法1時間前 1日	■---【投薬】 アプレビタントカプセル80mg … 1Cap 1日1回 朝食後 2日 ! テクトロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 3日			

出典:J Clin Oncol 2005;23:4602-4608