

頭頸部癌 パクリタキセル+セツキシマブ (PTX+C-mab)【初回】 Ver.1.3

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>ホファミン注5mg …2管 ! テキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(デカトロン2mg) … 1管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (30)分で投与 9時 投与 【抗癌剤ルート① フィルターなし】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 400mg/m² (2)時間で投与 【全量480mlに調製する】4ml/分 9時30分 投与 【抗癌剤ルート① フィルターなし】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 (30)分で投与 ○アービタックス終了後1時間経過観察 11時30分 投与 【抗癌剤ルート① フィルターなし】 点滴 … 1</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 12時 投与 (30)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■パクリタキセル(30、100) … 80mg/m² 12時30分 投与 (1)時間で投与 ○フィルター使用確認 【抗癌剤ルート② フィルターあり】</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 13時30分 投与 (15)分で投与 【抗癌剤ルート② フィルターあり】</p>	

出典:Annals of Oncology 23: 1016-1022, 2012