

# CHOP Ver.1.8

	Day1	Day2-5	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管                      ハロセロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋                      (? )時間で投与 … 1時間                      10時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(100、500) … 750mg/m<sup>2</sup>(400-1500)                      生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋                      (? )時間以上かけて … 3時間                      11時 投与                      点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m<sup>2</sup>(25-100)                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      (? )時間以上かけて … 1時間                      14時 投与                      【全量100mLに調製する】                      点滴 … 1</p> <p>■オンコビン(1) … 1.4mg/m<sup>2</sup>(1-2)                      生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分以上かけて … 15分                      15時 投与                      点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶                      (? )分で投与 … 15分                      15時15分 投与                      点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>！水溶性プレドニン50mg … 2管                      生理食塩液 100mL … 1瓶                      10時 投与                      点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 1993; 328: 1002-06

- day2-5の継続日数は患者様ごと変更される場合があります。
- ドキシソルピシン、オンコビンは患者様の状況で削除する場合があります。
- 外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。