

(限定)G-Bendamustine【2cycle以降】Ver.3.1

	Day1	Day2	Day3	Day28
抗がん剤	<p>■---【注射】 ! 水溶性ブレドニン20mg … 1管 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○前投薬の内服を確認! 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ガザイバ(1000mg固定量) … 1000mg/body 生理食塩液 (テルモ) 250mL … 0.84袋 スピード:25mL/h 【投与速度はプロトコール参照】 10時 投与 ○フィルター使用確認 ○全量250mLに調製! 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ガザイバ終了後 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサト注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■トリアキシン(100) … 90mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 10分 10時30分~10時40分まで 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ! テキサト注6.6mg(テカロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサト注1.65mg(テカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■トリアキシン(100) … 90mg/m<sup>2</sup> (?)分で投与 … 10分 10時30分~10時40分まで 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬			<p>■---【投薬】 ! テカロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★トリアキシン最終投与翌日より内服★★★ 2日</p>	

出典:N Engl J Med 2017;377:1331-44