

(限定)CHOP-G【2cycle以降】 Ver.1.3

	Day1	Day2	Day3-5	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注ハッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! 水溶性プレドニン50mg … 2管 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>■エンドキサン(500) … 750mg/m²(200-1875) 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 (?)時間以上かけて … 3時間 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>■ドキシソルピシン(10、50) … 50mg/m²(25-125) 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)時間以上かけて … 1時間 【全量100mLに調製する】 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>■オンコピン(1) … 1.4mg/m²(1-2) 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分以上かけて … 15分 15時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 15時15分 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>! 水溶性プレドニン50mg … 2管 生理食塩液 100mL … 1瓶 (?)時間で投与 … 1時間 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>■ガザイバ(1000mg固定量) … 1000mg/body 生理食塩液(テルモ) 250mL … 0.84袋 スピード: 25mL/h 【投与速度はプロトコール参照】 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>○フィルター使用確認 ○全量250mLに調製! ○前投薬の内服を確認!</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ガザイバ終了後 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>! 水溶性プレドニン50mg … 2管 生理食塩液 100mL … 1瓶 10時 投与 点滴 … 1</p>	

出典: N Engl J Med 2017;377:1331-44

○外来の場合、day3-5のプレドニン100mgは内服で。