

大腸癌 ヘパシマブ+mFOLFOX6(4回目以降) Ver.3.2

	Day1	Day14
抗がん剤	■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残りプライミングに使用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘパシマブ … 5mg/kg(150-500) 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1 パロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(デカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1 ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン … 85mg/m² ○レボホリナートと同時投与開始 (?)時間で投与 … 2時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m² 13時 投与 静脈内注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後フラッシュ 13時 投与 点滴 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m² 13時 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーポンプを使用 持続点滴 … 1	
投薬	■---【投薬】 ! テキサート錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日	
検査	■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回	

出典:Kabbinavar FF,et al.:J Clin Oncol:23,3706(2005)