

大腸癌 ベバシズマブ+FOLFIRI(4回目以降)Ver.4.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残ブリーミングに使用。 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 5mg/kg 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1</p> <p>ハロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 !テキサート注 6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 !テキサート注 1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m² (?)時間で投与 … 1.5時間 11時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (2)時間で投与 11時 投与 側管注 … 1</p> <p>■5-FU(1000) … 400mg/m² 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 13時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 13時 投与 点滴 … 1</p> <p>■5-FU(1000) … 2400mg/m² 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 13時 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製】インフューザーホンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 !テカドロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算十血液像 … 1回 化学療法 血糖(随时) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回</p>	