

# 大腸癌 ヘバシスマブ+★mFOLFOXIRI(4回目以降) Ver.3.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>点滴 … 1 生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ヘバシスマブ(100、400) … 5mg/kg 10時 投与 (30)分で投与</p> <p>ハロ/セトロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (30)分で投与 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカイン(40、100) … 150mg/m<sup>2</sup> (1)時間で投与 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチニン(50、100) … 85mg/m<sup>2</sup> (2)時間で投与 12時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (2)時間で投与 12時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 オキサリ後フラッシュ 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m<sup>2</sup> スピード:2.2mL/h 14時15分 投与 【全量100mlに調製】インフューザーホンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テカドロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 総ビリルビン … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1 CRP … 1回</p>	

出典1: Oncology. 2012; 82(4): 242-8

出典2: Annals of Oncology 27: 1386-1422, 2016

出典3: Oncotarget, 2018, vol.9(27), 18811-18820

★UGT1A1の精査を行うことが望ましい。