

大腸癌 ベバシズマブ+IRIS療法(2回目以降)Ver.1.1

| | Day1 | Day15 | Day28 |
|------|---|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 5mg/kg (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 !デキサト注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキサト注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 100mg/m² (?)分で投与 … 90分 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時30分 投与 点滴 … 1</p> | <p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ(100、400) … 5mg/kg (?)分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 !デキサト注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキサト注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 100mg/m² (?)分で投与 … 90分 11時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 12時30分 投与 点滴 … 1</p> | |
| 投薬 | <p>■---【投薬】 ■エスワン … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 14日分 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与2週休薬(IRIS)</p> | | |
| 検査 | <p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コレインエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回</p> | <p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コレインエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回</p> | |

○出典: Ann Oncol 2018;29:624-631

| | S-1 | | |
|-------|-------------------------------|--|------------------------------|
| | 体表面積 1.25m ² 未満 | 体表面積 1.25m ² ～1.5m ² 未満 | 体表面積 1.5m ² 以上 |
| 初回基準量 | 40mg/回 (80mg/日) | 50mg/回 (100mg/日) | 60mg/回 (120mg/日) |
| 1段階減量 | 休薬 | 40mg/回 (80mg/日) | 50mg/回 (100mg/日) |
| 2段階減量 | 休薬 | 休薬 | 40mg/回 (80mg/日) |