

大腸癌 ベバシズマブ+カペシタビン(4回目以降)Ver.2.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10時 投与 (?)分で投与 … 15分 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベバシズマブ … 7.5mg/kg 10時15分 投与 (?)分で投与 … 30分 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 フラッシュ用 10時45分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 投与量は下記参照(1回量) 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 ○2週投与1週休薬(BV/Cape) 14日</p>	

体表面積(m ²)	1回用量(1日2回)		
	初回投与量	減量段階①	減量段階②
1.36未満	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)	600mg(2錠)
1.36以上 ~ 1.41未満	1,500mg(5錠)	1,200mg(4錠)	900mg(3錠)
1.41以上 ~ 1.51未満			
1.51以上 ~ 1.66未満			
1.66以上 ~ 1.81未満	1,800mg(6錠)		
1.81以上 ~ 1.96未満			
1.96以上 ~ 2.11未満	2,100mg(7錠)	1,500mg(5錠)	1,200mg(4錠)
2.11以上			