

大腸癌 ラムシルマブ(RAM) + FOLFIRI Ver.1.5

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残ブライミングに使用。 10時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注 6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注 1.65mg(テガドロン2mg) … 2管 (?) 分で投与 … 30分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与: レスタミン錠 10mg … 5錠 10時15分 投与 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■サイラムザ(100、500) … 8mg/kg (?) 時間で投与 … 1時間 ○フィルター使用確認 ○全量250mLに調製! ○初回問題なければ30分投与可 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカイン(40、100) … 150mg/m² ○レボホリナートと同時投与開始 (?) 時間で投与 … 1.5時間 12時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?) 時間で投与 … 2時間 12時 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>■5-FU(250、1000) … 400mg/m² 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 14時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 5分 ポーラス後フラッシュ 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>■5-FU(250、1000) … 2400mg/m² 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 14時15分 投与 (?) mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーホンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テガドロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コレステロール … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 尿一般定性 … 1回</p>	

出典: Lancet Oncol., 16(5), 499-508, (2015)