

# 大腸癌 ベクティビックス+mFOLFOX6 Ver.3.1

	Day1	Day14
	<p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 10mLフラッシュ、残りブライミングに使用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>ハプロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注 6.6mg(テガドロン 8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注 1.65mg(テガドロン 2mg) … 2管 10時15分 投与 (?)分で投与 … 15分 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベクティビックス … 6mg/kg (?)時間で投与 … 1時間 【全量100mLに調製】 ○フィルター使用確認 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○Pmab投与後1時間経過観察を説明 11時45分 投与 点滴 … 1</p>	
抗がん剤	<p>ブドウ糖注 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン … 85mg/m<sup>2</sup> ○レボホリナートと同時投与開始 (?)時間で投与 … 2時間 12時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m<sup>2</sup> (?)時間で投与 … 2時間 12時 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m<sup>2</sup>(300-800) 14時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 14時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m<sup>2</sup>(2000-4800) 14時15分 投与 (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーポンプを使用 持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テガドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日</p>	