

大腸癌 ベケティビックス+FOLFIRI Ver.3.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 アロキソ静注0.75mg 5mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 15分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 9時45分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■ベケティビックス … 6mg/kg (?)時間で投与 … 1時間 【全量100mLに調製】 ○フィルター使用確認 10時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○Pmab投与後1時間経過観察を説明 11時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン … 150mg/m²(80-375) (?)分以上かけて … 90分 ○レボホリナートと同時投与開始 11時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 11時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m²(300-800) ホーラス投与 13時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 13時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m²(2000-4800) (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーホンプを使用 13時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テカドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	