

大腸癌 アービタックス【2週毎】+mFOLFOX6 Ver.2.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>ハロ/セトロン点滴静注ハッグ0.75mg/50mL … 1袋 ！デキサート注6.6mg(デカロン8mg)瓶 … 1瓶 ！デキサート注1.65mg(デカロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 500mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 【全量480mLに調製】4mL/分 10時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明 12時 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m² ○レボホリナートと同時投与開始 (?)時間で投与 … 2時間 12時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 12時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 400mg/m² ホーラス投与 14時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 14時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 2400mg/m² (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーポンプを使用 14時15分 投与 中心静脈注射 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】</p> <p>！デカドン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	

出典: J Clin Oncol 2009; 27: 663-671