

消化器 大腸癌 アービタックス【2週毎】+FOLFIRI Ver.2.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p> ■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1 ハロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ！テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ！テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■アービタックス … 400mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 【全量480mLに調製】4mL/分 10時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明 12時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン … 150mg/m²(80-360) ○レボホリナートと同時に投与開始 (?)分以上かけて … 90分 12時15分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 12時15分 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m²(300-800) ホース投与 14時15分 投与 中心静脈注射 … 11 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホース後フラッシュ 14時15分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m²(2000-4800) (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーポンプを使用 14時15分 投与 中心静脈注射 … 1 </p>	
投薬	<p> ■---【投薬】 ！テカトロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日 </p>	
検査	<p> ■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(随時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回 </p>	