

(限定)大腸癌 triplet(C-mab+ビラフトビ+メクトビ)【2週毎】Ver.2.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 9時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>前投与:レスマシン錠10mg … 5錠 9時 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 9時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■アービタックス … 500mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 【全量480mLに調製する】4ml/分 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明 11時30分 投与 点滴 … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2019; 381(17): 1632-43

★ビラフトビ、メクトビは手動入力になります！(ビラフトビ:1回300mgを1日1回、メクトビ:1回45mgを1日2回毎日内服)

★ビラフトビ、メクトビは患者限定薬です。限定申請書の提出をお願い致します。

サブグループ解析では、2剤併用群と比較して、PSが1、転移臓器数が3以上、ベースライン時のCRP>1mg/dL、原発巣の未切除又は不完全切除の患者では、3剤併用群の方が優れていた。