

(限定)大腸癌(BRAF V600E変異陽性1st) ビラフトビ+アービタックス+mFOLFOX6 Ver.1.1

	Day1	Day14
	■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL、フラッシュ用 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 前投与:レスタミン錠10mg … 5錠 9時30分 投与 ○アービタックス投与30分前 化学療法前投与(内服) … 1 ハロメトン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テカトロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカトロン2mg) … 2管 (?)分で投与 … 30分 9時30分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■アービタックス(100) … 500mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 【全量480mLに調製】4mL/分 10時 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 ○アービタックス終了後1時間経過観察を説明 12時 投与 中心静脈注射 … 1 ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 85mg/m² ○レボホリナートと同時に投与開始 (?)時間で投与 … 2時間 12時15分 投与 中心静脈注射 … 1 生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?)時間で投与 … 2時間 12時15分 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 400mg/m² ホーラス投与 14時15分 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 5分 ホーラス後フラッシュ 14時15分 投与 側管注 … 1 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(250、1000) … 2400mg/m² (?)mL/時間 … 2.2mL 【全量100mLに調製】インフューザーポンプを使用 14時15分 投与 中心静脈注射 … 1	
抗がん剤		
投薬	■---【投薬】 ビラフトビカプセル 75mg … 4Cap 1日1回 朝食後 14日 ! テカトロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日	

出典: N Engl J Med 2025; 392: 2425-37