

消化器 胃癌 mFOLFOX6 Ver.1.3

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注 6.6mg(テカドロン 8mg) … 1瓶 ! テキサート注 1.65mg(テカドロン 2mg) … 2管 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与</p> <p>点滴 5% 250mL … 1瓶 ■オキサリプラチン … 85mg/m² ○レボホリナートと同時投与開始 (?) 時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?) 時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 400mg/m² 12時30分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 5分 ホーラス後のフラッシュ 12時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU … 2400mg/m² 12時30分 投与 (?) mL/時間 … 2.2mL 【全量100mlに調製】インフューザーポンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テカドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 【注射翌日より内服】 2日</p>	

出典:NCCNガイドライン