

胃癌(HER2陽性)ヘムブロリスマブ+トラスツズマブ(6mg/kg)+CapeOX療法(2回目以降) Ver.1.1

	Day1 Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 ○フライミング用 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg (30)分で投与 ○フィルター使用確認! 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>バロ/セトロン点滴静注パック0.75mg 50mL … 1袋 アドリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 1管 (30)分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■トラスツズマブ … 6mg/kg (90)分で投与 ○初回問題なければ30分投与可。 点滴 … 1 11時15分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15)分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2)時間で投与 13時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 15時 投与 点滴 … 1</p>
投薬	<p>■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 2000mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 14日 注射当日の【夕食後】より開始。</p> <p>! テカドロン錠【4mg】… 1錠 1日1回 朝食後 2日 ★★★化学療法翌日より内服★★★</p>
検査	<p>■---【検査】 血算十血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>

出典:Lancet 2023;402:2197-208

★キイトルーダは最大35回まで

★オキサリプラチンの投与は6または8サイクルまで