

胃癌(HER2陽性)ペムプロリスマブ+トラスツズマブ(6mg/kg)+SOX(2回目以降) Ver.1.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15) 分で投与 ○ブライミング用 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶 ■キイトルーダ(200mg固定量) … 200mg (30) 分で投与 ○フルボ使用確認! 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL … 1袋 アロカ入点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テガドロン2mg) … 1管 (30) 分で投与 10時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■トラスツズマブ … 6mg/kg (90) 分で投与 ○初回問題なければ30分投与可。 点滴 … 1 11時15分 投与</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (15) 分で投与 12時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>7%ガラクトン注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチニン(50、100) … 130mg/m² ! テキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 0.5瓶 (2) 時間で投与 13時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フルッシュ用 15時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■ティーエスワン(OD) … 下記参照 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(Pem/Tmab/SOX) 14日</p> <p>! テガドロン錠【4mg】… 1錠 1日1回 朝食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コレステロール … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典 : Lancet 2023;402:2197-208

★キイトルーダは最大35回まで

★オキサリプラチニンの投与は6または8サイクルまで

	オキサリプラチニン (L-OHP)	TS-1		
		体表面積 1.25m ² 未満	体表面積 1.25m ² ~1.5m ² 未満	体表面積 1.5m ² 以上
初回基準量	130mg/m ²	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)	60mg/回 (120mg/日)
1段階減量	100mg/m ²	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)	50mg/回 (100mg/日)
2段階減量	75mg/m ²	25mg/回 (50mg/日)	※ (60mg/日)	40mg/回 (80mg/日)

※TS-1が60mg/日の場合は、朝40mg、夕20mgに分割して投与する。

★G-SOXとは減量時の投与量が異なることに注意する。