

胃癌 ゾルベツキシマブ(600mg/m²)+CapeOX(2回目以降) Ver.1.1

	Day1	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 250mL「フロー」… 1袋 9時30分 投与 メイルート用 点滴 … 1</p> <p>アセリオ静注液1000mgバッグ100mL … 0.5袋 ガスター注射液20mg 2mL … 1管 ホラミン注 5mg1mL … 2管 (15) 分で投与 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テガドロン2mg) … 2管 (30) 分で投与 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 250mL「フロー」… 1袋 ■ビロイ(100) … 600mg/m² 注射用水 100mL … 1瓶 10時15分 投与 <input type="radio"/> フィルター使用確認 <input type="radio"/> 患者さんの状態を確認し、2時間以上かけて12時間以内で投与する <input type="radio"/> 問題なければ98mL/hで投与 <input type="radio"/> 問題なければ98mL/hで投与 ★ビロイ100mgあたり5mLの注射用水で溶解</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50、100) … 130mg/m² (2) 時間で投与 16時15分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5) 分で投与 フラッシュ用 18時15分 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■カペシタビン(C法) … 2000mg/m² 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始。 14日 ! テガドロン錠【4mg】… 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★ 化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随时) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典：Nature Medicine 2023;29:2133-2141