

胃癌 ゾルヘツキシマブ(400mg/m²)+mFOLFOX6(2回目以降) Ver.1.1

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10mL ポートラッシュ用 9時30分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 250mL「ツリー」 … 1袋 9時30分 投与 マイシルト用 点滴 … 1</p> <p>アセトロ静注液1000mgパック100mL … 0.5袋 カドラー注射液20mg 2mL … 1管 ボラジン注 5mg/1mL … 2管 (15)分で投与 9時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>ハロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 !デキサート注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶 !デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 2管 (30)分で投与 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 フラッシュ用 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 250mL「ツリー」 … 1袋 ■ビロイ(100) … 400mg/m² 注射用水 100mL … 1瓶 10時15分 投与 ○フルタ-使用確認 ○患者さんの状態を確認し、2時間以上かけて12時間以内で投与する ○問題なければ135mL/hで投与 ★ビロイ100mgあたり5mLの注射用水で溶解</p> <p>アトウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチン(50, 100) … 85mg/m² ○ホリナートと同時投与開始 (2)時間で投与 16時15分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (2)時間で投与 16時15分 投与 側管注 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 400mg/m² 18時15分 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5)分で投与 ボラス後のフラッシュ 18時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m² スピード: 2.2mL/h 18時15分 投与 【全量100mlに調製する】インフューザーポンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 !デカド-錠[4mg] … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像+好中球数(機械値) … 1 化学療法 血糖(随时) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総bilirubin … 1回 コレステロール … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Ci … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典 : Lancet 2023;401:1655-68