

膵癌 mFOLFIRINOX Ver.2.2

	Day1	Day14
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 20mL(管) … 1管 10ml、フラッシュ用 10時 投与 静脈内注射 … 1</p> <p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL … 1袋 アロカリス点滴静注 235mg 10mL … 1瓶 ! テキサート注 6.6mg(テカドロン 8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注 1.65mg(テカドロン 2mg) … 2管 (?) 分で投与 … 30分 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 250mL(袋) … 1袋 ■オキサリプラチニン(50、100) … 85mg/m²(50-) (?) 時間で投与 … 2時間 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋 ■イリノテカン(40、100) … 150mg/m²(100-) ○レボホリナート同時投与開始 (?) 時間で投与 … 1.5時間 12時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液(テルモ) 500mL … 1袋 ■レボホリナート … 200mg/m² (?) 時間で投与 … 2時間 12時30分 投与 精密持続点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (5) 分で投与 イリノテカン後フラッシュ 14時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ■5-FU(1000) … 2400mg/m²(1200-) 14時30分 投与 (?) mL/時間 … 2.2mL 【全量 100mL に調製】インフューザーホンプを使用 精密持続点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ! テカドロン錠【4mg】 … 2錠 1日2回 朝・昼食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 3日</p>	

出典: Cancer Chemotherapy and Pharmacology (2018)81:1017-1023