

(患者限定)膵癌 GEM+S1[切除不能進行] Ver.3.2

	Day1	Day8	Day21
抗がん剤	<p>■---【注射】 ハロ/セトロン点滴静注パック'0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テガドロン2mg) … 2管 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (?) 分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	<p>■---【注射】 ハロ/セトロン点滴静注パック'0.75mg/50mL … 1袋 ! テキサート注6.6mg(テガドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テガドロン2mg) … 2管 (?) 分で投与 … 15分 10時15分 投与 点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶 ■ゲムシタビン(200、1g) … 1000mg/m² (?) 分で投与 … 30分 10時30分 投与 【全量100mLに調製する】 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?) 分で投与 … 15分 11時 投与 点滴 … 1</p>	
投薬	<p>■---【投薬】 ■ティーエスワン … 60mg(1.25m²未満)、 80mg(1.25~1.5m²未満)、 100mg(1.5m²以上) 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p> <p>! テガドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	<p>■---【投薬】 ■ティーエスワン … 60mg(1.25m²未満)、 80mg(1.25~1.5m²未満)、 100mg(1.5m²以上) 1日2回 朝・夕 食後 注射当日の【夕食後】より開始 ○2週投与1週休薬(GEM+S1) 7日</p> <p>! テガドロン錠 4mg … 2錠 1日2回 朝・昼 食後 ★★★化学療法翌日より内服★★★ 2日</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 血糖(隨時) … 1回 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 総ビリルビン … 1回 コリンエステラーゼ … 1回 γ-GTP … 1回 総蛋白 … 1回 ALB … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 UA … 1回 Na,K,Cl … 1 Ca … 1回 CRP … 1回</p>	

出典:ASCO2011 ABSTRACT No.4007 GEST study