

# 膵癌 GEM+S1〔術前補助〕 Ver.2.1

|      | Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Day8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Day21 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 抗がん剤 | <p>■――【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋</p> <p>！デキサート注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶</p> <p>！デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 2管</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>10時15分 投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶</p> <p>■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup></p> <p>(?)分で投与 … 30分</p> <p>10時30分 投与</p> <p>【全量100mLに調製する】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>11時 投与</p> <p>点滴 … 1</p> | <p>■――【注射】</p> <p>パロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL … 1袋</p> <p>！デキサート注6.6mg(デカドロン8mg)瓶 … 1瓶</p> <p>！デキサート注1.65mg(デカドロン2mg) … 2管</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>10時15分 投与</p> <p>点滴 … 1</p> <p>ブドウ糖注 5% 100mL … 1瓶</p> <p>■ゲムシタピン(200、1g) … 1000mg/m<sup>2</sup></p> <p>(?)分で投与 … 30分</p> <p>10時30分 投与</p> <p>【全量100mLに調製する】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>11時 投与</p> <p>点滴 … 1</p> |       |
| 投薬   | <p>■――【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 80mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、<br/>100mg(1.25–1.5m<sup>2</sup>未満)、<br/>120mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後</p> <p>注射当日の【夕食後】より開始</p> <p>○2週投与1週休薬(GEM+S1)</p> <p>7日</p> <p>！デカドロン錠 4mg … 2錠</p> <p>1日2回 朝・昼 食後</p> <p>★★★化学療法翌日より内服★★★</p> <p>2日</p>                                                                                                                        | <p>■――【投薬】</p> <p>■ティーエスワン … 80mg(1.25m<sup>2</sup>未満)、<br/>100mg(1.25–1.5m<sup>2</sup>未満)、<br/>120mg(1.5m<sup>2</sup>以上)</p> <p>1日2回 朝・夕 食後</p> <p>注射当日の【夕食後】より開始</p> <p>○2週投与1週休薬(GEM+S1)</p> <p>7日</p> <p>！デカドロン錠 4mg … 2錠</p> <p>1日2回 朝・昼 食後</p> <p>★★★化学療法翌日より内服★★★</p> <p>2日</p>                                                                                                                        |       |
| 検査   | <p>■――【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回</p> <p>化学療法</p> <p>血糖(随時) … 1回</p> <p>AST(GOT) … 1回</p> <p>ALT(GPT) … 1回</p> <p>ALP … 1回</p> <p>LDH … 1回</p> <p>総ビリルビン … 1回</p> <p>コリンエステラーゼ … 1回</p> <p>γ-GTP … 1回</p> <p>総蛋白 … 1回</p> <p>ALB … 1回</p> <p>BUN … 1回</p> <p>クレアチニン … 1回</p> <p>UA … 1回</p> <p>Na,K,Cl … 1</p> <p>Ca … 1回</p> <p>CRP … 1回</p>                                                                     | <p>■――【検査】</p> <p>血算+血液像 … 1回</p> <p>化学療法</p> <p>血糖(随時) … 1回</p> <p>AST(GOT) … 1回</p> <p>ALT(GPT) … 1回</p> <p>ALP … 1回</p> <p>LDH … 1回</p> <p>総ビリルビン … 1回</p> <p>コリンエステラーゼ … 1回</p> <p>γ-GTP … 1回</p> <p>総蛋白 … 1回</p> <p>ALB … 1回</p> <p>BUN … 1回</p> <p>クレアチニン … 1回</p> <p>UA … 1回</p> <p>Na,K,Cl … 1</p> <p>Ca … 1回</p> <p>CRP … 1回</p>                                                                     |       |

出典:J Clin Oncol 2019;37:189

★術前に2コース行う