

# 転移・再発乳癌 ベバシズマブ＋パクリタキセル(BV＋wPTX) Ver.2.1

|      | Day1  | Day8   | Day15   | Day28 |
|------|---|--|---|-------|
| 抗がん剤 | <p>■――【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>9時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>プライミング用</p><br><p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ベバシズマブ(100、400) … 10mg/kg</p> <p>10時 投与</p> <p>(90)分で投与</p> <p>○2回目は60分、それ以降は30分投与可！</p><br><p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶</p> <p>！デキサート注1.65mg(デカトロン2mg) … 1管</p> <p>ファモチジン静注20mg 20mL … 1管</p> <p>(15)分で投与</p> <p>11時30分 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>前投与:レスタシン錠10mg … 5錠</p> <p>11時30分 投与</p> <p>化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(30)分で投与</p> <p>○レスタシン内服確認</p> <p>11時45分 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m<sup>2</sup></p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋</p> <p>(1)時間で投与</p> <p>12時15分 投与</p> <p>○フィルター使用確認</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(15)分で投与</p> <p>○パクリタキセル終了後</p> <p>13時15分 投与</p> <p>点滴 … 1</p> | <p>■――【注射】</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶</p> <p>！デキサート注1.65mg(デカトロン2mg) … 1管</p> <p>ファモチジン静注20mg 20mL … 1管</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>10時 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>前投与:レスタシン錠10mg … 5錠</p> <p>10時 投与</p> <p>化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(?)分で投与 … 30分</p> <p>○レスタシン内服確認</p> <p>10時15分 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m<sup>2</sup></p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋</p> <p>(?)時間で投与 … 1時間</p> <p>10時45分 投与</p> <p>○フィルター使用確認</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(?)分で投与 … 15分</p> <p>○パクリタキセル終了後</p> <p>11時45分 投与</p> <p>点滴 … 1</p> | <p>■――【注射】</p> <p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>9時45分 投与</p> <p>(15)分で投与</p> <p>プライミング用</p><br><p>点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 100mL … 1瓶</p> <p>■ベバシズマブ(100、400) … 10mg/kg</p> <p>10時 投与</p> <p>(90)分で投与</p> <p>○2回目は60分、それ以降は30分投与可！</p><br><p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>！デキサート注6.6mg(デカトロン8mg)瓶 … 1瓶</p> <p>！デキサート注1.65mg(デカトロン2mg) … 1管</p> <p>ファモチジン静注20mg 20mL … 1管</p> <p>(15)分で投与</p> <p>11時30分 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>前投与:レスタシン錠10mg … 5錠</p> <p>11時30分 投与</p> <p>化学療法前投与(内服) … 1</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(30)分で投与</p> <p>○レスタシン内服確認</p> <p>11時45分 投与</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>■パクリタキセル(30、100) … 90mg/m<sup>2</sup></p> <p>生理食塩液(テルモ) 250mL … 1袋</p> <p>(1)時間で投与</p> <p>12時15分 投与</p> <p>○フィルター使用確認</p> <p>点滴 … 1</p><br><p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶</p> <p>(15)分で投与</p> <p>○パクリタキセル終了後</p> <p>13時15分 投与</p> <p>点滴 … 1</p> |       |
| 検査   | <p>■――【検査】</p> <p>血算＋血液像 … 1回</p> <p>化学療法</p> <p>AST(GOT) … 1回</p> <p>ALT(GPT) … 1回</p> <p>ALP … 1回</p> <p>LDH … 1回</p> <p>BUN … 1回</p> <p>クレアチニン … 1回</p> <p>Na,K,Cl … 1</p> <p>CRP … 1回</p> <p>尿一般定性 … 1回</p>   | <p>■――【検査】</p> <p>血算＋血液像 … 1回</p> <p>化学療法</p> <p>AST(GOT) … 1回</p> <p>ALT(GPT) … 1回</p> <p>ALP … 1回</p> <p>LDH … 1回</p> <p>BUN … 1回</p> <p>クレアチニン … 1回</p> <p>Na,K,Cl … 1</p> <p>CRP … 1回</p>  | <p>■――【検査】</p> <p>血算＋血液像 … 1回</p> <p>化学療法</p> <p>AST(GOT) … 1回</p> <p>ALT(GPT) … 1回</p> <p>ALP … 1回</p> <p>LDH … 1回</p> <p>BUN … 1回</p> <p>クレアチニン … 1回</p> <p>Na,K,Cl … 1</p> <p>CRP … 1回</p> <p>尿一般定性 … 1回</p>   |       |

出典:N Engl J Med 2007; 357: 2666-76