

乳癌(HER2陽性) wHER(継続 2mg/kg) + wPTX【7日 コース】 Ver.4.1

	Day1	Day7
抗がん剤	<p>■---【注射】 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 ファモチジン静注20mg 20mL … 1管 ! テキサート注6.6mg(テカドロン8mg)瓶 … 1瓶 ! テキサート注1.65mg(テカドロン2mg) … 1管 (?)分で投与 … 15分 9時45分 投与 点滴 … 1</p> <p>前投与:レスタン錠10mg … 5錠 9時45分 投与 化学療法前投与(内服) … 1 1回 生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 30分 ○レスタン内服確認 10時 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 (テルモ) 250mL … 1袋 ■パクリタキセル(30、100) … 80mg/m² (?)分で投与 … 60分 ○フィルター使用確認 10時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>■ハーセプチン … 2mg/kg ○初回投与が問題なければ30分まで短縮可。 (90)分で投与 11時30分 投与 点滴 … 1</p> <p>生理食塩液 50mL(瓶) … 1瓶 (?)分で投与 … 15分 13時 投与 点滴 … 1</p>	
検査	<p>■---【検査】 血算+血液像 … 1回 化学療法 AST(GOT) … 1回 ALT(GPT) … 1回 ALP … 1回 LDH … 1回 BUN … 1回 クレアチニン … 1回 Na,K,Cl … 1</p>	

出典:N Engl J Med 2015; 372: 134-41、British Journal of Cancer(2004) 90, 36-40

★【補助療法】12コース実施。その後、トラスツズマブのみ計1年継続。

★【再発・転移】毎週投与